

Achtung bei folgenden Medikamenten und CED

Diese Medikamente sollten von Betroffenen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung **NICHT** genommen werden. Bei Fragen und Unsicherheiten wenden Sie sich an Ihren behandelnden Arzt. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



Diese Liste gilt für die Präparate aller **Hersteller**, **alle Arzneiformen** der aufgeführten Wirkstoffe (egal ob Tablette, Zäpfchen, Injektion, Creme, sowie jede andere Form) und **alle Stärken** (Angabe in mg, forte, mite).

Wirkstoff	Produktname
Acemetacin	Tilur
Dexibuprofen	Seractil
Dexketoprofen	Kettesse
Diclofenac	Amavita Diclofenac
	Coop Vitality Diclofenac 25-N
	Diclofenac
	Ecofenac
	Flector
	Grofenac
	Inflamac
	Olfen
	SUN STORE Diclofenac
	Tonopan forte 25 mg
	Voltaren
Diclofenac/Misoprostol	Arthrotec
Etodolac	Lodine
Flurbiprofen	Angisil-X Dolo mint
	FlurbiAngin Sandoz
	Froben
	Mebucaïne Dolo
	neo-angin dolo
	Strepsils
Ibuprofen	Alges-X
	Algifor
	Amavita Ibuprofen 400
	Brufen
	Contra-Schmerz IL 400
	Coop Vitality Ibuprofen 400
	Dismenol
	Dolocyl forte
	Dolo-Spedifen
	Ibu Sandoz 400
	Ibufelan
	Ibufen-L
	Ibuprofen
	Irfen

Ibuprofen	Nurofen
	Optifen
	Pretufen
	Saridon
	Sonotryl Neue Formel
	Spedifen
	Sun Store Ibuprofen 400
	Treupel Dolo forte Ibuprofen 400
Indometacin	Indocid-Retard
Ketorolac	Tora-Dol
Mefenaminsäure	Mefenacid
	Mefenaminsäure Sandoz
	Mephadolor 500 Neo
	Ponstan
	Spiralgin 500
Naproxen	Aleve
	Apranax
	Naproxen Mepha
	Proxen
Nimesulid	Aulin 100
	Nisulid 100
Piroxicam	Felden
	Piroxicam-Mepha
Tenoxicam	Tilcotil

Bei den folgenden Medikamenten (Salicylate) ist das Risiko einer Unverträglichkeit noch nicht klar erforscht. In kleineren Dosen (wie z. B. bei «Aspirin cardio») sind Salicylate für CED-Betroffene vermutlich unproblematisch.

Salicylate, inkl. Kombinationen	Alca-C
	Alcacyl
	Alka-Seltzer
	Amavita Dolopirin-N
	ASA-Tabs
	Aspégic
	Aspirin
	Aspro 500
	Contra-Schmerz plus
	Coop Vitality Acetylsalicylsäure 500
	KAEX dolo

COX-II selektive NSAR («Coxibe»)

COX-II selektive NSAR («Coxibe») gelten auch bei IBD als sicher und lösen höchstwahrscheinlich keine Schübe aus. Dies wurde in Studien bei Patienten mit IBD bewiesen. Nur im Falle eines zuvor beobachteten Zusammenhangs zwischen Einnahme von Coxiben und einem Schub sollte auch auf diese Medikamente verzichtet werden.

Celecoxib	Celebrex
	Celecoxib
Etoricoxib	Arcoxia
	Etoricoxib

