

Attenzione ai seguenti farmaci e CED

Questi farmaci **NON** dovrebbero essere assunti da persone affette da una malattia infiammatoria cronica intestinale. Per domande e dubbi, rivolgersi al proprio medico curante. L'elenco non è esaustivo.



La lista si applica ai preparati di tutti i **produttori**, a **tutte le forme farmaceutiche** dei principi attivi elencati (indipendentemente che siano compresse, supposte, iniezioni, creme o qualsiasi altra forma) e a **tutte le dosi** (indicate in mg, forte, mite).

Principio attivo Nome del prodotto

Acemetacina	Tilur
Dexibuprofene	Seractil
Dexketoprofene	Kettese
Diclofenac	Amavita Diclofenac Coop Vitality Diclofenac N-25 Diclofenac Mepha Ecofenac Flector Grofenac Inflamac Olfen SUN STORE Diclofenac Tonopan forte 25 mg Voltaren
Diclofenac / Misoprostolo	Arthrotec
Etodolac	Lodine Etodolac Nobel
Flurbiprofene	Amavita Flurbiprofene Coop Vitality Flurbiprofene Froben Mebucaïne Dolo neo-angin dolo Strepsils Dolo Sun Store Flurbiprofene
Ibuprofene	Alges-X Algifor Amavita Ibuprofene 400 Brufen Contra-Schmerz IL 400 Coop Vitality Ibuprofene Dismenol Dolo-Spedifen Ibu Sandoz 400 / Ibuprofene Sandoz Ibufelan Ibufen-L Ibuprofene Fresenius Ibuprofene Mylan Ibuprofene Zentiva Ibuprofene Viatrix Irfen Nurofen Optifen Saridon Sonotryl Neue Formel Spedifen Sun Store Ibuprofene 400 Treupel Dolo forte Ibuprofen 400 Zentidol
Ibuprofene + Paracetamolo	Algifor Dolo Duo Ibu Sandoz Plus Irfen Dolo Comp Optifen Dolo Duo

Ibuprofene + Pseudoefedrina	Pretufen Algifor Dolo Rhinogrippal
Indometacina	Indocid-Retard
Ketorolac	Tora-Dol
Acido mefenamico	Mefenacid Acido mefenamico Sandoz Mephadolor 500 Neo Ponstan Spiralgin 500
Naprossene	Aleve Apranax Naproxen / Naprossene Mepha Proxen
Naprossene + Esomeprazolo	Vimovo
Nimesulide	Aulin 100 Nisulid 100
Piroxicam	Felden Piroxicam-Mepha
Tenoxicam	Tilcotil

Per i seguenti farmaci (salicilati), il rischio di intolleranza non è ancora chiaramente definito. A dosi minori (come ad esempio in «Aspirina cardio»), i salicilati probabilmente non presentano problemi per i pazienti affetti da CED.

Salicilati, incluse le combinazioni	Alca-C compresse effervescenti Alcacyl 500 polvere istantanea Alcacyl compresse Alka-Seltzer compresse effervescenti Amavita Dolopirin-N compresse ASA-Tabs Aspégic Inject 0,5 g Aspégic polvere, forte polvere, mite polvere Aspirina granulato, compresse masticabili Aspirina 500 compresse istantanee Aspirina Complex granulato Aspirina S compresse Aspirina-C compresse effervescenti Aspro 500 compresse effervescenti Contra-Schmerz plus compresse Coop Vitality acido acetilsalicilico 500 compresse KAEX dolo compresse
-------------------------------------	---

COX-II selettivi FANS («Coxib»)

Anche i FANS selettivi per COX-II («Coxibi») sono considerati sicuri per la IBD e molto probabilmente non scatenano ricadute. Questo è stato dimostrato in studi condotti su pazienti con IBD. Solo nel caso di una correlazione precedentemente osservata tra l'assunzione di Coxibi e una ricaduta, si dovrebbe evitare anche l'uso di questi farmaci.

Etoricoxib	Arcoxia Etoricoxib Mepha Etoricoxib Mylan Etoricoxib Spirig Etoricoxib Zentiva
Celecoxib	Celebrex Celecoxib Axapharm Celecoxib Helvepharm Celecoxib Mepha Celecoxib Sandoz Celecoxib Spirig Celecoxib Xiromed Celecoxib Zentiva