

# Attention avec les médicaments suivants en cas de MICI

Les personnes atteintes d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin **NE DOIVENT PAS** prendre ces médicaments. En cas de questions ou de doutes, adressez-vous à votre médecin traitant. Cette liste ne saurait être considérée comme exhaustive.



Cette liste est valable pour les préparations **de tous les fabricants, toutes les formes galéniques** des principes actifs indiqués (comprimé, suppositoire, injection, crème ou toute autre forme) et **toutes les concentrations** (indication en mg, forte, mite).

Principe actif	Nom du produit
Acémétacine	Tilur
Dexibuprofène	Seractil
Dexketoprofène	Kettesse
Diclofénac	AMAVITA Diclofenac Coop Vitality Diclofenac 25-N Diclofénac Ecofénac Flector Grofenac Inflamac Olfen SUN STORE Diclofénac Tonopan forte 25 mg Voltaren(e)
Diclofénac / misoprostol	Arthrotec
Étodolac	Lodine Étodolac NOBEL
Flurbiprofène	Amavita Flurbiprofène Coop Vitality Flurbiprofène Froben Mebucaïne Dolo neo-angin dolo Strepils Dolo Sunstore Flurbiprofène
Ibuprofène	Alges-X Algifor Amavita Ibuprofène 400 Brufen Contre-Douleurs IL 400 Coop Vitality Ibuprofène 400 Dismenol Dolo-Spedifen Ibu Sandoz 400 Ibufelan Ibufen-L Ibuprofène Ibuprofène Mylan Ibuprofène Zentiva Ibuprofène Viatris Irfen Nurofen Optifen Saridon Sonotryl Nouvelle Formule Spedifen Sun Store Ibuprofène 400 Treupel Dolo forte Ibuprofène 400 Zentidol
Ibuprofène + paracétamol	Algifor Dolo Duo Ibu Sandoz Plus Irfen Dolo Comp Optifen Dolo Duo

Ibuprofène + pseudoéphédrine	Pretufen Algifor Dolo Rhinogrippal
Indométacine	Indocid-Retard
Kétorolac	Tora-Dol
Acide méfénamique	Méfénacide Acide méfénamique Sandoz Mephadolor 500 Neo Ponstan Spiralgin 500
Naproxène	Aleve Apranax Naproxène Mepha Proxen
Naproxène + ésoméprazole	Vimovo
Nimésulide	Aulin 100 Nisulid 100
Piroxicam	Felden Piroxicam-Mepha
Ténoxycam	Tilcotil

Pour les médicaments suivants (salicylates), le risque d'intolérance n'a pas encore été entièrement élucidé. A petites doses (comme avec «Aspirine Cardio»), les salicylates ne posent vraisemblablement aucun problème pour les personnes atteintes de MICI.

Analgésique, salicylé, préparation combinée	Alca-C comprimés effervescents Alcacyl 500 poudre instantanée Alcacyl comprimés Alka-Seltzer comprimés effervescents Amavita Dolopirin-N comprimés ASA-Tabs Aspégic Inject 0,5 g Aspégic poudre, forte poudre, mite poudre Aspirine granulé, comprimés à mâcher Aspirine 500 comprimés instantanés Aspirine Complex granulé Aspirine S comprimés Aspirine-C comprimés effervescents Aspro 500 comprimés effervescents Contre-Douleurs plus comprimés Coop Vitality acide acétylsalicylique 500 comprimés KAEX dolo comprimés
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## AINS sélectifs de la COX-2 («coxibs»)

Les AINS sélectifs de la COX-2 («coxibs») sont considérés comme sûrs même en cas de MICI et ne déclenchent très vraisemblablement aucune poussée de la maladie. Cela a été démontré dans des études menées sur des patients souffrant de MICI. Ce n'est que dans le cas d'un lien précédemment observé entre la prise de coxibs et une poussée de la maladie que ces médicaments doivent être évités.

Étoricoxib	Arcoxia Étoricoxib Mepha Étoricoxib Mylan Étoricoxib Spirig Étoricoxib Zentiva
Célécoxib	Celebrex Célécoxib Axapharm Célécoxib Helvepharm Célécoxib Mepha Célécoxib Sandoz Célécoxib Spirig Célécoxib Xiromed Célécoxib Zentiva